

# Carta della vegetazione

Buccheri M., Gallizia Vuerich L., Martini F., Ortolan I., Sergio P.



## Legenda

- Acque salate e/o salmastre
- Aggruppamenti a cannuccia palustre e giunco marittimo (*Phragmites communis*/*Juncus maritimi*)
- Aggruppamenti a giunco marittimo e lisca marittima (*Juncus maritimi*/*Phragmites communis*)
- Aggruppamenti a lisca marittima (*Phragmites communis*)
- Aree sottoposte a forte pressione antropica (urbane, ricreative, ecc.)
- Canneti a cannuccia palustre (*Phragmites vulgaris*)
- Cenosi di depressioni retrodunali debolmente alofite (*Eriantho-Schoenetum nigricantis*)
- Cenosi erbacee delle dune interne (*Ammophiletalia* cfr. *Psammo-Koelerion*)
- Cenosi erbacee di interferenza con elementi di praterie aride e prati da sfalcio (*Festuco-Brometalia*/*Molinio-Arrhenatheretalia*)
- Cenosi pioniere delle spiagge (*Salsola kali-Cakiletum maritimae*)
- Cenosi pioniere di dune embrionali (*Sporobolus arenarii-Agropyretum juncei*)
- Cenosi ruderali arboreo-arbustive (*Prunetalia*)
- Cenosi ruderali erbacee (*Artemioetalia*, *Stellarietalia*, *Agropyretalia*, *Plantaginietalia*)
- Coltivazioni e piantumazioni
- Facies ad alofite succulente annuali su terreni di riporto
- Facies di interferenza fra cenosi di prati aridi e cenosi ruderali (*Sedo-Scleranthetalia*/*Festuco-Brometalia*/*Stellarietalia*)
- Filari di alberi
- Formazioni arbustive con ontano nero (*Prunetalia*)
- Giuncheti e praterie umide salate e salmastre (*Juncus maritimi*)
- Giuncheti e praterie umide salate e salmastre (*Juncus maritimi*) con predominanza di *Arthrocnemum*
- Giuncheti e praterie umide salate e salmastre (*Juncus maritimi*) con predominanza di *Spartina juncea*
- Leccete con pino nero (*Quercion ilicis*)
- Leccete pure (*Quercion ilicis*)
- Mantelli termofili (*Cytision sessilifolii*)
- Mosaico fra cenosi erbacee delle dune interne e mantelli termofili (*Ammophiletalia* cfr. *Psammo-Koelerion* / *Cytision sessilifolii*)
- Mosaico fra praterie aride a lino delle fate veneto e mantelli termofili (*Satureion subspicatae*/*Cytision sessilifolii*)
- Mosaico fra praterie umide e mantelli termofili (*Molinion caeruleae*/*Cytision sessilifolii*)
- Mosaico fra praterie umide e praterie aride a lino delle fate veneto (*Molinion caeruleae*/*Satureion subspicatae*)
- Mosaico fra siepi termofile e cenosi prative di interferenza (*Prunetalia*/*Festuco-Brometalia*/*Molinio-Arrhenatheretalia*)
- Mosaico fra siepi termofile e praterie aride a lino delle fate veneto (*Prunetalia*/*Satureion subspicatae*)
- Pinete artificiali a pino domestico (*Pinus pinea*)
- Popolamenti a falasco (*Maricetum serrati*)
- Popolamenti a sparto marittimo (*Spartinetalia maritimae*)
- Popolamenti erbacei ad elevato dinamismo
- Praterie aride a lino delle fate veneto (*Satureion subspicatae*)
- Praterie umide a molinia (*Molinion caeruleae*)
- Prati pingui da sfalcio (*Arrhenatherion elatioris*)
- Sabbie prive di colonizzazione vegetale
- Siepi termofile (*Prunetalia*)
- Vegetazione delle dune embrionali, mobili e semifisse (*Ammophilon arenariae*)

Scala 1:5000

0 500 1000 Metri